

## Прва помош во случај на Анафилакса (First Aid for Anaphylaxis)

### ЗНАЦИ НА БЛАГА ДО УМЕРЕНА АЛЕРГИСКА РЕАКЦИЈА

- Отекување на усните, лицето, очите
- Осип или отоци
- Пецкање на устата
- Болки во stomакот, повраќање (тоа се знаци на анафилакса за алергија од инсекти)

### ПОСТАПКИ ПРИ БЛАГА ДО УМЕРЕНА АЛЕРГИСКА РЕАКЦИЈА

- За алергија на инсекти - извлекете го осилото ако е видливо
- За алергија на крлежи - замрзнете го крлежот и пуштите да отпадне кога ќе се осуши
- Останете со лицето и повикајте брза помош
- Најдете го адреналинот (епинефрин) со самовбризгувачкиот шприц
- Телефонирајте му на семејството / најблиски род за итни случаи

**Благи до умерени алергиски реакции (како што се осип или отекување) не мораат секогаш да настанат пред почеток на анафилакса (тешка алергиска реакција)**

### ВНИМАВАЈТЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ЗНАЦИ НА АНАФИЛАКСА

- Тешко / бучно дишење
- Отекување на јазикот
- Оток / стегане во грлото
- Отежнато дишење или постојана кашлица
- Тешкотии при зборување и / или рапав глас
- Постојана вртоглавица или колапс
- Бледи и млитави (млади деца)

### ПОСТАПКИ ПРИ АНАФИЛАКСА (ТЕШКА АЛЕРГИСКА РЕАКЦИЈА)

#### 1. Лицето треба да лежи рамно

#### НЕ ДОЗВОЛИТЕ МУ да застане или да оди

Ако лицето е несвесно, ставете го во положба за оживување

Ако дишењето му е отежнато овозможете му да седне



#### 2. Дадете му адреналин со самовбризгувачкиот шприц

#### 3. Телефонирајте за брза помош - 000 (АВ) or 111 (НЗ)

#### 4. Телефонирајте му на семејството / најблиски род за итни случаи

#### 5. Дополнителни дози на адреналин можат да се дадат ако нема реакција по 5 минути

#### 6. Префрлете го лицето во болница за најмалку 4 часа набљудување

#### Ако не сте сигурни, дадете инјекција на адреналин со авто-вбризгувачот

Веднаш почнете со давање на вештачко дишење, ако лицето не реагира и не дише нормално

### СЕКОГАШ давајте го ПРВО самовбризгувачкиот шприц со адреналин, а

**потоа инхалатор за астма.** Ако некој со утврдена астма и алергија на храна, инсекти или лекови има **НЕНАДЕЖНИ ТЕШКОТИИ ПРИ ДИШЕЊЕТО** (вклучувајќи недостаток на здив, постојана кашлица или рапав глас), дури и ако нема никакви симптоми на кожата